



20

Floras silvestres

FÁCILES DE CULTIVAR



FLORIDA
Wildflower
FOUNDATION



Selección

Seleccione especies que se adapten naturalmente a condiciones de suelo, luz y drenaje similares a las de su paisaje. Si sus flores silvestres no tienen éxito, inténtelo de nuevo, tal vez con especies diferentes. Recuerde que el éxito depende de usar la planta adecuada en el lugar adecuado.

Agua

Riegue bien las plantas al sembrarlas, luego riegue según sea necesario hasta que se establezcan y echen nuevo follaje. Una vez establecidas las plantas, sólo será necesario regarlas durante los periodos de sequedad prolongada. Aprenda a reconocer cuando las plantas parecen marchitas y riéguelas en ese momento. El exceso de riego puede causar hongos y podredumbre, lo cual puede matar sus flores silvestres. También puede hacer que crezcan demasiado rápido, haciéndolas susceptibles a plagas y enfermedades, o demasiado altas, lo que requeriría entutorarlas.

Fertilizante

Las flores silvestres autóctonas no deberían necesitar fertilizante. La aplicación de fertilizantes puede hacer que las plantas crezcan demasiado rápido, lo que puede hacerlas propensas a plagas y enfermedades, y demasiado altas, lo que requeriría entutorarlas. La fertilización también fomenta la aparición de malas hierbas, las cuales pueden desplazar a las flores silvestres.

Mantenimiento de flores silvestres

Si desea que las flores silvestres persistan por sí solas en su paisaje, tendrá que permitir que se auto-siembren, especialmente las especies anuales o de corta vida. Mantenga áreas abiertas y ligeramente cubiertas de mantillo para que germinen las semillas. También puede recolectar semillas y plantarlas donde lo desee. Cuando las semillas germinen, tendrá que reconocer los brotes de flores silvestres para no arrancarlos cuando deshierre. Para descargar un documento PDF que muestra algunas plántulas de flores silvestres comunes, visite www.FlaWildflowers.org/planting.

Muchas flores silvestres son de hoja caduca y mueren en el invierno, sobre todo en las zonas más frías del estado. No plante sobre ellas antes de que rebroten en la primavera, y no las deshierre cuando broten. Marque las zonas con plantas de hoja caduca para estar atento a su reaparición estacional.

Mantillo

Recomendamos la paja de pino de Florida. Para ayudar a prevenir la germinación de malas hierbas en el primer o segundo mes tras la plantación, aplique una capa de mantillo de 2 a 4 pulgadas, pero manténgala alejada de la base de las plantas. Una vez que las plantas estén establecidas y antes de que florezcan por completo, reduzca cuidadosamente el mantillo a una capa fina. Demasiado mantillo puede contribuir a problemas de hongos y podredumbre. Para promover la auto-siembra, esparza el mantillo lo suficientemente fino como para que pueda ver el suelo por debajo.

Zonas de rusticidad

Se incluye información sobre las zonas de rusticidad de cada especie. Para ver en qué zona se encuentra su hogar o proyecto, consulte el mapa que figura en el interior de la contraportada.

Términos botánicos

Para ver las definiciones de términos botánicos, visite en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_botanical_terms.

Otras especies

Si desea información sobre otras especies de flores silvestres no mencionadas en esta publicación, consulte los perfiles de plantas en www.FlaWildflowers.org/category/flower-friday.

Los símbolos en la parte superior de cada página le pueden ayudar a seleccionar las plantas adecuadas para su ubicación geográfica y las condiciones de suelo y luz. También lo ayudarán a elegir plantas en función de otros factores, como el color y la temporada de floración, así como el tipo de polinizadores que le gustaría atraer a su paisaje.

Color de floración

- | | | | |
|---|----------|---|---------|
|  | Blanco |  | Rosa |
|  | Rojo |  | Naranja |
|  | Amarillo |  | Verde |
|  | Azul |  | Morado |
|  | Marrón | | |

Esta clave de colores es una guía general; los colores exactos de las flores pueden variar.

Temporada de floración

- | | |
|---|-----------|
|  | Primavera |
|  | Verano |
|  | Otoño |
|  | Invierno |

Luz

- | | |
|---|-----------------------|
|  | Pleno sol |
|  | Sol parcial/ sombra |
|  | Tolerante a la sombra |

Humedad del suelo

- | | |
|---|---------------|
|  | Seco |
|  | Seco a húmedo |
|  | Mojado |

Hábito

Esta es la altura media de una planta madura.

Fauna silvestre uso

La planta es una fuente de néctar, semillas u otros insectos, o es una planta huésped de larvas.



Esta publicación ha sido elaborada por la Florida Wildflower Foundation (FWF) con el apoyo de Stanley Smith Horticultural Trust. El financiamiento también fue proporcionado por la placa de matrícula de flores silvestres del estado. FWF agradece la participación de Florida Association of Native Nurseries. © 2023 Florida Wildflower Foundation.

Créditos de las fotos de portada (en el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda): Paisaje con Dune sunflower (*Helianthus debilis*) por Lisa Roberts; Pinebarren goldenrod (*Solidago fistulosa*) por Ryan Brown; Tropical sage (*Salvia coccinea*) por Troy Springer; y Monarca con Pink milkweed (*Asclepias incarnata*) by Peg Urban.



Pink milkweed

Las especies de *Asclepias* o algodoncillo producen flores llamativas de diversos colores. Son excelentes para atraer mariposas y otros insectos polinizadores. Son imprescindibles para las mariposas Monarca, pues constituyen su planta huésped principal.

La Florida tiene 21 especies autóctonas de *Asclepias*, la mayoría de las cuales son perennes. Hay seis disponibles en el mercado, los más comunes son Butterflyweed (*A. tuberosa* subsp. *rolfsii*), Pink milkweed (*A. incarnata*) y White milkweed (*A. perennis*).

Butterflyweed es el algodoncillo autóctono más reconocido. Se da en tierras altas y arenosas y es buena para paisajes secos. Pink milkweed es una especie llamativa y constituye una excelente adición a los paisajes húmedos y soleados. White milkweed también es bueno para zonas húmedas a mojadas.

Descripción

Las flores de *Asclepias* constan de pétalos que se doblan hacia atrás y una corona erguida de capuchones crestados que a menudo se confunden con pétalos.

Butterflyweed es el algodoncillo autóctono más reconocido. Produce vistosos racimos de flores de color naranja rojiza brillante y tiene hojas gruesas de forma ovalada a lanceolada. Florece desde finales de primavera hasta finales de otoño. Butterflyweed carece



Mariposa reina en White milkweed



Mariposa de la media luna faón en Butterflyweed

de la savia lechosa de la mayoría de los algodoncillos. La subespecie de Florida tiende a ser menos tupida que su homóloga del norte.

Las flores de Pink milkweed varían en color de rosa claro a rosa. Sus hojas son de forma lanceolada a lineal y miden hasta 6 pulgadas de largo.

White milkweed produce flores de color blanco a rosa pálido. Es una especie de algodoncillo más corto y delicado. Sus hojas tienen forma de lanza y son de color verde brillante. Produce cabezuelas más pequeñas que las otras.

Plantación

El algodoncillo funciona mejor en jardines mixtos de mariposas y flores silvestres. En el paisaje, separe las plantas de 2 a 3 pies en grupos de tres o más plantas.

Semillas

Las semillas, pequeñas y planas, nacen en vainas que se dividen para liberar las semillas. Cada semilla tiene adheridos unos filamentos blancos y sedosos que facilitan su dispersión por el viento. Se pueden recoger las semillas de las plantas una vez que las vainas se hayan abierto. Por lo general, las semillas de algodoncillo de ecotipo autóctono no están disponibles en el mercado.

Las semillas se pueden guardar en el refrigerador durante un par de meses. Plante las semillas cubriéndolas apenas con la tierra. Las plántulas deben plantarse en macetas y dejarse crecer hasta 3 pulgadas antes de trasplantarlas.

Plantas

Los algodoncillos suelen estar disponibles en macetas de 4 pulgadas, 6 pulgadas, y un galón.

Cuidado

La mayoría de los algodoncillos requieren una poda anual ligera para eliminar los tallos muertos.

Condiciones del sitio

Butterflyweed se adapta mejor a suelos secos a ligeramente húmedos, bien drenados y a pleno sol. Los Pink y White milkweeds requieren suelos entre húmedos y mojados, y se dan bien en los bordes de estanques o lugares similares. Pueden tolerar períodos cortos de sequía una vez establecidas, pero el suelo debe mantenerse entre húmedo y mojado en el verano. Pink milkweed se desarrolla mejor a pleno sol, pero puede adaptarse a la sombra parcial. White milkweed puede tolerar más sombra. Ambas se dan bien en macetas.

Mariposas y abejas

El algodoncillo es la planta huésped larvaria de las mariposas Monarca, Reina y Soldado, y es una fuente importante de néctar para éstas y otras mariposas, como las colas de golondrinas Pipevine, Spicebush y Cometa negra.

Las abejas nativas sudoríparas, las abejas cortadoras de hojas y las abejas amarillas forrajean las flores en busca de polen y néctar.

Zonas de rusticidad

Butterflyweed y Pink milkweed son los más adecuados para las zonas 8A-10B; White milkweed se da mejor en las zonas 8A-9B.

No confunda estas plantas con su pariente no autóctono, Tropical milkweed (*Asclepias curassavica*), que suele venderse en los centros de jardinería de las cadenas grandes. *A. curassavica*, que no muere en el invierno en Florida como los algodoncillos autóctonos, puede fomentar la hibernación de mariposas monarca adultas y está relacionada con la transmisión de la infección *Ophryocystis elektroscirrha* (OE). Infórmese sobre las especies para asegurarse de que compra una autóctona, o visite un vivero especializado en plantas autóctonas. Al comprar plantas o semillas de algodoncillo, busque y solicite ecotipos locales reproducidos a partir de semillas recolectadas de forma responsable.

ADVERTENCIA



1½–4'

Néctar



Maryland goldenaster



Abejorro en Coastalplain goldenaster

Goldenaster (*Chrysopsis* spp.) es miembro de la familia Asteraceae (daisy). Los miembros de este género se distribuyen desde el noreste de los Estados Unidos hasta el sur del medio oeste y todo el sureste. La Florida tiene 11 especies autóctonas de *Chrysopsis*, de las cuales ocho son endémicas. Búsquelos principalmente en hábitats de matorrales y pinares bien drenados.

Descripción

Entre los goldenasters de Florida hay especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, y varias están catalogadas por el Estado como raras o en peligro de extinción. Las especies más comunes son Maryland goldenaster (*Chrysopsis mariana*) y Coastalplain goldenaster (*C. scabrella*). Maryland goldenaster se encuentra en pinares bien drenados en toda la Florida, salvo en los extremos del sur. Coastalplain goldenaster es una planta bienal de corta vida que crece en las colinas arenosas de la península, salvo en los extremos del sur.

Florida goldenaster (*C. floridana*) es raro por naturaleza — endémico sólo en cuatro condados del oeste de Florida Central. Sin embargo, suele estar disponible comercialmente y es fácil de cultivar. Es más compacta que otras especies de *Chrysopsis* y resulta más atractiva a finales de primavera y principios de verano, cuando no está en flor. Su hermoso follaje blanco plateado recuerda al altramuz.

Los racimos de flores amarillas tipo margarita de Goldenaster son alegres y profusos, con múltiples brotes al final de cada rama. La floración suele alcanzar su punto álgido a finales de verano o principios de otoño y dura hasta un mes, dependiendo de la especie. Todas son caducifolias, perdiendo su follaje en el invierno y resurgiendo en la primavera de una roseta basal de hojas suaves y lanosas cubiertas de “pelos” blancos densos.

Coastalplain goldenaster puede llegar a ser alto, con tallos que pueden alcanzar hasta 4 pies. Sus floraciones se limitan a la corona de la planta. Maryland goldenaster crece de forma más compacta que sus primos, con una

altura de hasta 18 pulgadas. Sus hojas son elípticas y de color verde brillante, y su follaje vistoso, junto con sus flores más grandes, la hacen atractiva para los paisajes.

Mariposas y abejas

El néctar de las flores de la planta es atractivo para las mariposas autóctonas, así como para una variedad de abejas autóctonas de lengua larga, como las abejas verdes metálicas, las abejas sudoríparas, las abejas cortadoras de hojas, los abejorros, las abejas mineras y las abejas minadoras.

Plantación

Goldenaster is drought tolerant once Goldenaster tolera la sequía una vez establecida y rinde mejor a pleno sol, pero también se adapta a la sombra de los pinos altos. Utilícelo como complemento de “sección media” en los jardines, plantándolo bien detrás del borde. Debido al crecimiento desperejo de algunas especies, considere plantar goldenaster entre flores silvestres robustas que puedan ayudar a mantener las plantas erguidas.



Follaje blanco plateado de Florida goldenaster

Cuando se planta en masa, goldenaster puede llamar la atención cuando florece — sólo tenga en cuenta su naturaleza caducifolia.

Las plantas *Chrysopsis* pueden plantarse en cualquier momento y deberían florecer al año de su plantación. Sin embargo, si las plantas son grandes y están a punto de florecer cuando se plantan, es posible que no tengan tiempo de establecerse lo suficientemente bien como para producir una abundancia de flores.

Semillas

Las semillas de Maryland goldenaster están disponibles a través de la Florida Wildflower Seed Cooperative. Siembre en suelo bien drenado a finales de otoño o en invierno. Las semillas recogidas de las plantas deben sembrarse inmediatamente.

Plantas

Maryland goldenaster es la especie más disponible que venden los viveros de especies autóctonas, mientras que tipos Florida y Coastalplain están disponibles ocasionalmente.

Cuidado

Goldenaster necesita poco o ningún mantenimiento. Resista la tentación de recortar los tallos cuando se extienda; al hacerlo, reducirá su capacidad de floración. Deje que las semillas maduren en los tallos una vez finalizada la floración otoñal, y se verá recompensado con más plantas la primavera siguiente. Cuando los tallos mueren y se vuelven quebradizos, se pueden recortar de la planta.

Condiciones del sitio

En general, goldenaster le gusta el pleno sol y se da mejor en suelos arenosos bien drenados. Plante Coastalplain goldenaster en suelos arenosos y bien drenados. Florida goldenaster se desarrolla mejor en arenas blancas, tipo matorral. Es más probable que vuelva a sembrar en estas condiciones. Maryland goldenaster tolera condiciones más húmedas y orgánicas que otras especies de *Chrysopsis*. Todas las especies disponibles comercialmente se adaptan bien a los paisajes urbanos soleados si no se riegan en exceso.

Zonas de rusticidad

Maryland goldenaster es adecuado para las zonas 8A-9B. Florida and Coastalplain goldenaster son más adecuadas para la zona 9.

○ ●
☼ ☼ ☼
☼
💧
2-3'
Néctar



Conradina canescens

Las plantas del género *Conradina* o False rosemary pueden parecerse a su prima homónima, cuyas hojas se utilizan como una especia sabrosa para cocinar, pero estos miembros de la familia de Lamiaceae (menta) emiten un olor a menta fresca cuando se trituran sus hojas. Hay seis especies de *Conradina* en Florida; sólo una, *Conradina canescens*, no está considerada en peligro o amenazada.

Las plantas son de hoja perenne y recompensan a los jardineros con un despliegue de flores fragantes de color blanco-lavanda.

Descripción

Conradina son pequeños arbustos perennes que maduran en matas de 2 a 3 pies de ancho y de alto, de color verde plateado. Sus hojas cortas y aciculares crecen densamente de tallos erguidos que se ramifican a partir de un tallo leñoso principal.

Conradina canescens ocurre en la península (Panhandle) occidental, y se encuentra en áreas secas perturbadas y en dunas. Short-leaved false rosemary (*C. brevifolia*) una



Conradina grandiflora con hojas aciculares

especie en peligro de extinción incluida en la lista federal, sólo se encuentra en hábitats de matorral en los condados de Polk y Highlands, en el centro-sur de Florida. Se extiende con dedos gráciles que le dan un carácter único aparte de *C. canescens*. Largeflower false rosemary (*C. grandiflora*), una especie amenazada incluida en la lista estatal puede encontrarse en los matorrales de condados costeros en el centro y sur de la península. Tiene flores más grandes y un crecimiento más erguido. Todas son muy resistentes a la sequía una vez establecidas.

Las flores prolíficas cubren la *Conradina* en la primavera, y la planta puede seguir floreciendo hasta finales de otoño. Esta cubierta vegetal versátil y resistente a los ciervos puede utilizarse en plantaciones masivas, como un ejemplar aislado o en una maceta.

Plantación

Conradina puede durar tres o más años en los paisajes. Plante en un suelo arenoso y bien drenado, y riegue hasta que se establezca. *Conradina* emite una sustancia química que suprime el crecimiento de otra vegetación, incluyendo las malas hierbas, por lo que puede ser beneficiosa, pero también puede restringir el crecimiento de otras plantas cercanas.

Semillas

Las semillas no están disponibles comercialmente, pero pueden recogerse de las plantas cuando están frescas. Siembre en la primavera en suelo bien drenado y manténgalo húmedo hasta la germinación.

Plantas

Las plantas están fácilmente disponibles en viveros especializados en plantas autóctonas. *Conradina* también se puede plantar fácilmente a partir de esquejes (brotes terminales no ramificados de 4 pulgadas) en tierra bien drenada en macetas pequeñas. Rocíe diariamente y no deje que la tierra se

seque. Póde antes del trasplante o en el plazo de una semana tras el trasplante. Pellizque las puntas para fomentar la ramificación.

Cuidado

Conradina puede podarse después de la floración, pero la mayoría de los jardineros la dejan en paz y disfrutan de su hermosa forma natural. Algunas partes de las plantas más viejas y bien establecidas pueden morir repentinamente; retírelas para estimular un nuevo crecimiento. *C. grandiflora* tolera algo de riego por aspersión o por goteo. Otras especies de *Conradina* sólo deben regarse durante periodos secos prolongados. Dado que esta planta crece de forma natural en ecosistemas secos, el riego excesivo puede provocar su pudrición y declive.

Mariposas y abejas

Conradina es atractiva para algunas mariposas y polillas, pero atrae sobre todo a las abejas autóctonas, entre ellas las grandes abejas carpinteras y excavadoras. También se han visto abejas melíferas probando su néctar.

Condiciones del sitio

Conradina es ideal para suelos secos y arenosos a pleno sol. Prospera con precipitaciones naturales. Si su jardín se riega con regularidad, busque un lugar que permanezca seco.

Zonas de rusticidad

Conradina grandiflora es adecuada para la zona 9. *C. canescens* es ideal para 8A-9B.




Conradina grandiflora en un paisaje

De las seis especies de *Conradina* del estado, todas

ADVERTENCIA

menos *C. canescens* están en peligro o amenazadas y, por tanto, su población es limitada. Dado que estas especies pueden hibridarse, es importante plantar las especies que se encuentran naturalmente en su área para ayudar a preservar las distintas identidades genéticas y funciones ecológicas de estas plantas. En los condados de Polk y Highlands, elija *C. brevifolia*. A lo largo de la costa oriental central y meridional, elija *C. grandiflora*. Pregunte a su proveedor de viveros por las especies autóctonas de su localidad.



Leavenworth's tickseed

La flor silvestre estatal de Florida es *Coreopsis*, también conocida como tickseed o calliopsis, y se refiere a las 14 especies nativas de Florida. Muchas de ellas sólo se dan en el norte de Florida y en el Panhandle. La especie más común, Leavenworth's tickseed (*Coreopsis leavenworthii*), es casi totalmente endémica de Florida, lo que significa que no se encuentra de forma natural en ningún otro lugar del mundo. Esta planta se puede encontrar en toda Florida, especialmente en los bordes de las carreteras y en áreas perturbadas, bosques planos y praderas. Se ha utilizado para hacer té y para tratar diversas dolencias médicas.

Descripción

Leavenworth's tickseed es una planta anual, pero puede ser una planta perenne de corta duración en la mitad sur de Florida. Sus ramilletes de flores amarillas parecidas a las margaritas florecen durante todo el año cuando hace calor. Las flores, de 1 a 2 pulgadas, tienen centros oscuros rodeados de flósculos de rayos amarillos festoneados, que parecen pétalos, pero técnicamente no lo son. Leavenworth's tickseed crece de 1½ a 3 pies de altura en tallos delgados con muchas ramas. Sus hojas de color verde brillante son estrechas y van de simples a lobuladas o profundamente divididas, lo que confiere a la planta un aspecto más abierto.

Mariposas y abejas

Coreopsis es una gran planta de néctar para mariposas y olinizadores.

Plantación

Como planta anual o perenne de corta vida, Leavenworth's tickseed necesita un lugar que le ofrezca espacio para reseminar. Puede reseminar entre otras plantas, como otras flores silvestres, si no son demasiado

competitivas. Se pueden plantar en cualquier época del año; plántelas en la primavera para aprovechar al máximo su floración. Espacie a una distancia de 1 a 2 pies. *Coreopsis* se establece rápidamente en suelos húmedos.

Semillas

Las semillas están disponibles comercialmente, o puede cosechar las suyas propias. Maduran muy rápidamente después de que los pétalos de las flores se hayan marchitado. Busque semillas maduras con "alas" a los lados en la pequeña copa de la punta del tallo. La germinación ocurre generalmente en menos de siete días. Las primeras hojas de una plántula no son lobuladas y tienen las puntas redondeadas.

Plantas

Leavenworth's tickseed está disponible en cuartos de galón y en galones.

Cuidado

Dado que esta planta es anual, especialmente en las zonas más frías, no es necesaria la protección contra el frío. Leavenworth's tickseed está relativamente libre de enfermedades y plagas, aunque algunos animalitos pueden alimentarse de ella.

Si las plantas se podan cerca del final de su floración, producirán otro brote de flores. Las plantas se pueden podar o segar a una altura de 6 a 8 pulgadas.

Condiciones del sitio

Leavenworth's tickseed le gusta cualquier sitio abierto y húmedo, preferiblemente arenoso y drenado, pero no es muy particular con respecto a la acidez del suelo. El pleno sol produce la mayor cantidad de flores. Aunque puede tolerar algo de sequía y suelos más secos, no rendirá tan bien. Los suelos húmedos también permiten la resiembra, algo importante para mantener esta especie.

Zonas de rusticidad

Leavenworth's tickseed se adapta mejor a las zonas 8A–11.

Otras especies

Lanceleaf tickseed (*C. lanceolata*) crece de forma natural en el norte de Florida y el Panhandle en colinas arenosas y áreas perturbadas, pero se utiliza mucho más al sur. Es una planta perenne de corta vida que se resiembra con facilidad. Sus flores de rayos amarillos se complementan con un disco dorado sobre tallos bastante gruesos. Esta planta de floración primaveral puede florecer hasta el verano con la eliminación de la marchitez y es tolerante a la sequía.

Florida tickseed (*C. floridana*) es endémica en la Florida y crece en praderas y bosques planos de pinos húmedos en todo el estado. Esta planta perenne tiene hojas gruesas y carnosas y flores más grandes que las de Leavenworth's tickseed. Florece en otoño en tallos de hasta 3 pies de altura. Las flores de rayos amarillos rodean un disco marrón oscuro.



Lanceleaf tickseed



Florida tickseed

En el caso de *Coreopsis leavenworthii*, que se da en toda Florida, el origen de las plantas o de las semillas no parece ser un factor de éxito en el crecimiento, según investigaciones recientes. Si se están considerando otras especies de *Coreopsis*, busque fuentes locales, ya que la mayoría de las otras especies se dan lejos de Florida. Algunas como Lanceleaf tickseed también tienen variedades hortícolas populares desarrolladas a partir de progenie fuera de la Florida.

ADVERTENCIA

○ ● ●
☼ ☼ ☼
☼ ☼ ☼
☼ ☼ ☼
6–10 "
Huésped larvario, néctar



Oblongleaf twinflower

Si está buscando una cubierta vegetal fácil y de bajo mantenimiento, considere Oblongleaf twinflower (*Dyschoriste oblongifolia*). Esta flor silvestre perenne tiene un periodo de floración prolongado y se adapta a una gran variedad de condiciones. Prefiere las áreas abiertas y soleadas, pero puede tolerar la sombra (aunque las flores no serán tan abundantes). Suele florecer desde la primavera hasta el otoño y es común encontrarla en hábitats secos a húmedos de colinas arenosas, bosques planos y bosques mixtos de tierras altas por toda la península de Florida y hasta el centro del Panhandle. De las tres especies autóctonas de *Dyschoriste*, Oblongleaf twinflower es la más grande y la más comúnmente disponible para la compra.

Otras especies nativas de twinflower son Pineland twinflower (*D. angusta*) y Swamp twinflower (*D. humistrata*). Ambas especies son bastante pequeñas en comparación con *D. oblongifolia*. Swamp twinflower florece normalmente en la primavera. Es una excelente cubierta vegetal y sustituto del césped en suelos húmedos a mojados y se da muy bien en suelos sombreados y bien

drenados. También se adapta a condiciones estacionalmente secas. Pineland twinflower es más común en el sur de Florida, donde puede florecer todo el año.

Tanto Swamp como Pineland twinflower tienen flores más pequeñas que Oblongleaf twinflower. Las hojas de Swamp twinflower son más redondeadas y tienen un aspecto suculento, mientras que las de Pineland son lineales.

Twinflower se llama así porque sus flores nacen en parejas. También se conoce como hierba de serpiente.

Descripción

Oblongleaf twinflower crece entre 6 y 10 pulgadas de altura y se extiende. Sus pequeñas flores de 1 pulgada son de color azul claro a morado y tienen forma de embudo, con cinco pétalos lobulados. El pétalo inferior lleva marcas oscuras o rayas que se extienden hacia la garganta. Cada flor tiene cuatro estambres y cinco cálizos. Las hojas simples de la Twinflower son lineales, de color verde oscuro, pubescentes y dispuestas de forma opuesta sobre tallos delgados.

Mariposas y abejas

El néctar de la Twinflower atrae a algunas especies de mariposas, entre ellas la malaquita y pavo real blanco (el pavo real blanco). Es una planta hospedadora de Common buckeye ojo de venado. Busque pequeños huevos de color verde pálido puestos individualmente en las hojas. Las orugas de ojo de venado se alimentan tanto de hojas como de flores y pueden verse en las plantas durante todo el año y especialmente en otoño.

También atrae a las abejas cortadoras de hojas, los abejorros y las abejas melíferas.

Swamp twinflower, ya que empezará a perecer rápidamente si se seca.

Semillas

Las semillas no están disponibles comercialmente en este momento.

Plantas

Twinflower se encuentra a menudo en viveros especializados en plantas autóctonas.

Cuidado

En el invierno, las plantas están semi-latente y se pueden recortar o segar hasta 3 pulgadas para refrescarlas. Las plantas entrarán en latencia en las zonas que reciben heladas (normalmente en el norte de Florida), pero se recuperarán rápidamente en la primavera.

Condiciones del sitio

Oblongleaf twinflower prefiere pleno sol y suelos bien drenados. Si se planta en sombra parcial, la cubierta será menos densa. Swamp twinflower está acostumbrada a los suelos húmedos y a condiciones de sombra parcial. Pineland twinflower prefiere suelos calcáreos o arenosos bien drenados. Una vez establecida, es muy tolerante a la sequía.

Uno de los mejores usos de esta planta es como cubierta vegetal baja cerca de aceras, paseos o áreas naturalizadas. La planta se propaga por rizomas subterráneos y por semillas auto-sembradas. Florecerá de forma intermitente de primavera a otoño. Twinflower no tolera la sal, por lo que no es una buena candidata para los paisajes costeros.

Zonas de rusticidad

Oblongleaf twinflower is suitable for zones 8A–11. Pineland twinflower is best suited for zones 8A–10A, while Swamp twinflower does well in zones 8B–11.



Twinflower es una excelente cubierta vegetal.

Plantación

Las plantas deben instalarse con una distancia de 18 a 24 pulgadas entre sí, ya que se propagan rápidamente. Para propagarlas, haga esquejes o divida las matas en verano.

Twinflower forma densas colonias mediante estolones subterráneos. También es una auto-sembradora prolífica y, en las mejores condiciones, puede requerir el desherbado regular de las plántulas para mantenerla bajo control.

Las tres especies autóctonas de twinflower se adaptan bien a la vida en una cesta colgante o en una maceta. Preste atención a los niveles de humedad del suelo, sobre todo con la



Pineland twinflower



12–18 "

Néctar



Florida greeneyes

Florida greeneyes (*Berlandiera subacaulis*) es una flor silvestre herbácea perenne endémica de Florida. Aparece de forma natural en colinas arenosas, bosques planos de pinos secos y bosques mixtos de tierras altas, así como en los bordes secos de las carreteras. Suele florecer en primavera y verano, pero puede hacerlo durante todo el año en climas del sur.

Descripción

Las flores de Florida greeneyes consisten en flósculos de rayos amarillo vibrante que rodean una cabeza de flósculos de disco tubulares amarillos verdosos. Las flores están sostenidas en su base por una copa de brácteas suaves de color amarillo verdoso. Las semillas se desarrollan en las brácteas y maduran en una cabeza de semilla distintiva en forma de placa. Sólo las flores liguladas producen semillas.

Las hojas basales de la planta, de color verde oscuro, tienen forma ovalada con márgenes festoneados cuando son jóvenes; se vuelven más profundamente lobuladas a medida que maduran. Los tallos son vellosos.



Los márgenes de las hojas jóvenes están festoneados.



Nacarada del golfo en Florida greeneyes

Florida greeneyes (así como a otras especies de *Berlandiera*) han sido denominadas informalmente "flores de chocolate" porque los flósculos de disco abiertos emiten una fragancia sutil de chocolate.

Mariposas y abejas

Florida greeneyes atraen a una gran variedad de abejas y mariposas.

Plantación

Las plantaciones pueden establecerse mediante semillas o plantas. Separe las plantas hasta 12 pulgadas o mézclelas con gramíneas y otras flores silvestres.

Semillas

Las semillas están disponibles comercialmente, o recoja las suyas propias después de que caigan los flósculos de rayos y las semillas estén secas.



Florida greeneyes' cabeza de semilla en forma de placa

Plantas

Florida greeneyes está disponible en viveros que se especializan en plantas autóctonas. Se vende en contenedores de un cuarto de galón y de un galón.

Cuidado

Las plantas establecidas son tolerantes a la sequía, por lo que el riego suplementario puede ser necesario sólo durante períodos secos prolongados. Corta las cabezas de flores viejas para extender la floración y ayudar a que la planta se vea ordenada.

La propagación por división es posible, pero puede resultar difícil, ya que las plantas están unidas por una raíz tuberosa gruesa.

Condiciones del sitio

Florida greeneyes es fácil de establecer en el jardín. Crece mejor a pleno sol o a la sombra de un pino alto y en suelos arenosos o rocosos secos a moderadamente húmedos y bien drenados. Su raíz tuberosa, que puede ser tan gruesa como 12 pulgadas en plantas más viejas, la hace muy tolerante a la sequía. Una vez establecida, la Florida greeneyes puede formar grandes macizos y producir abundantes flores, creando un hermoso espectáculo.

Zonas de rusticidad

Florida greeneyes se adapta mejor a las zonas 8B–10B.



La planta es una flor profusa.



8–24 "

Néctar



Ron and Diane Bynum

Tampa verbena



Andrea England

Beach verbena

En la Florida se dan tres especies autóctonas de Verbena. Dos de ellas — Beach verbena (*Glandularia maritima*) y Tampa verbena (*G. tampensis*) — figuran en la lista estatal de especies endémicas y en peligro de extinción. Ambos son atractivos y funcionan bien en paisajes.

Descripción

Tampa verbena se da en las costas este y oeste de la península de Florida, desde los condados de Lee a Levy en el lado oeste y desde los condados de Volusia a Indian River en el este. Beach verbena se encuentra sobre todo en la costa este — desde los condados de St. Johns a Monroe — pero también se ha documentado en el condado de Levy, en la costa oeste.

La verbena produce racimos de flores de color rosa intenso a lavanda durante todo el año, aunque la floración más prolífica se produce en primavera y verano. Sus flores — junto con su naturaleza adaptable y sus hojas atractivas de color verde oscuro en forma de diamante — le han valido un lugar en muchos jardines. Ambas especies son plantas de hoja perenne de corta duración, que duran hasta tres años.



Melanie Long

Cebra heliconia en Tampa verbena

Mariposas y abejas

La verbena es una buena fuente de néctar para una gran variedad de mariposas y polillas, como nacarada del golfo en, esfíngidos y los salteadores de cola larga. También atrae a las abejas minadoras y a las de lengua larga, como los abejorros y las abejas de las orquídeas.

Plantación

Utilice la verbena como cubierta vegetal baja en un parterre, en el borde de un bosque o en un contenedor o plantador sobre el suelo. Resulta especialmente llamativo cuando se utiliza en masas. Las plantas deben tener una separación de 3 a 4 pies para permitir su propagación. Pueden plantarse en cualquier momento entre febrero y diciembre.

Semillas

Las semillas de estas especies no suelen estar disponibles comercialmente. La verbena no resiembra fácilmente en los paisajes.

Plantas

Las plantas están disponibles en los viveros de plantas autóctonas y en algunos viveros minoristas convencionales.

Cuidado

La verbena está relativamente libre de plagas y enfermedades, siempre que no se riegue demasiado. Puede ser necesaria una poda ligera en ambientes más formales;

por lo demás, las plantas no requieren mantenimiento.

Condiciones del sitio

Beach verbena se adapta a una gran variedad de suelos ácidos y alcalinos, incluidos los arcillosos, limosos y arenosos. Pruébela en suelos secos y pobres en nutrientes donde otras plantas tienen problemas para crecer; no la riegue en exceso. Plántela a pleno sol. Como se encuentra en comunidades costeras, su tolerancia a la sal y a la sequía es alta.

Tampa verbena prefiere más humedad y puede adaptarse a pleno sol y sombra parcial. Se da bien en contenedor, siempre que reciba suficiente sol y se riegue a menudo.

La verbena puede sufrir daños por las heladas en los condados del norte.

Zonas de rusticidad

Beach verbena se adapta mejor a las zonas 8B–11, mientras que Tampa verbena es mejor para las zonas 9A–10B.



Peg Urban


Tampa verbena

Hay muchas verbenas no autóctonas disponibles.

ADVERTENCIA

Asegúrese de preguntar a su vivero o proveedor por las especies autóctonas.

Las especies de verbena pueden hibridarse, por lo que es importante plantar las especies que se encuentran de forma natural en su zona para ayudar a preservar las distintas identidades genéticas y funciones ecológicas de estas plantas.



Dune sunflower

De las 17 especies autóctonas de girasol que hay en la Florida, los jardineros encontrarán con más frecuencia Dune o Beach sunflower (*Helianthus debilis*). Dune sunflower crece de forma natural a lo largo de la costa, pero se adapta bien al interior.

Descripción

Dune sunflower, una planta perenne de flores amarillas brillantes florece durante todo el año. En el norte de la Florida muere en invierno. Dependiendo de la variedad (vea Advertencia), esta planta puede extenderse o erguirse. Como cubierta vegetal, puede extenderse varios metros, pero por lo general no sobrepasa 1 o 2 pies de altura. La variedad erguida puede ser más alta.

Plantación

Deje espacio al Dune sunflower, ya que se propaga con facilidad. Plantar en masas con una separación de 3 a 4 pies. No riegue después del establecimiento. Las plantas pueden sembrar prolíficamente. Las plántulas se pueden desenterrar y reubicar con cuidado. Asegúrese de regar bien las plántulas trasplantadas hasta que se establezcan.

Semillas

Las semillas están disponibles comercialmente. Para recolectar sus propias semillas, deje que las cabezas de las flores se sequen en las plantas y luego ábralas para recoger las semillas.

Plantas

Dune sunflower está ampliamente disponible en contenedores en viveros autóctonos. También suele estar disponible en centros de jardinería comerciales. (Vea Advertencia.)

Cuidado

Con el tiempo, el Dune sunflower se volverá mustio y de aspecto desordenado. Quite los tallos viejos y deje que broten nuevas plantas de las semillas. Un ligero recorte cada tres meses ayudará a mantener el follaje con

un aspecto fresco. Esta planta también se regenerará a partir de la raíz si los inviernos son suaves.

Condiciones del sitio

Plante dune sunflower a pleno sol para una mejor floración. Las plantas toleran una sombra ligera durante parte del día.

Dune sunflower tolera la sal y el viento. Le gustan los suelos arenosos muy bien drenados. Evite las situaciones de humedad persistente o de riego intenso.

Zonas de rusticidad

Dune sunflower se da mejor en las zonas 8A-11.

Mariposas y abejas

Todos los girasoles autóctonos de la Florida son excelentes plantas de néctar para las mariposas y los polinizadores.

Otras especies

Narrowleaf sunflower (*H. angustifolius*) también puede estar disponible en viveros especializados en plantas autóctonas. Crece de forma natural en todo el Panhandle, el norte y el centro de Florida hacia el sur hasta el lago Okeechobee y es adecuado para las zonas 8A-10A. Prefiere suelos ácidos húmedos.

Las vistosas flores doradas del Narrowleaf sunflower miden 3 pulgadas de diámetro y tienen el centro de color marrón rojizo. Puede alcanzar de 4 a 6 pies de altura. Tiene hojas largas, estrechas y ásperas y florece en otoño. Puede morir en invierno, particularmente en el norte de la Florida. Es una buena opción para un prado grande, soleado y húmedo; la orilla de un lago o un estanque de retención; una zanja; o la parte trasera de un jardín de turberas. Se propaga agresivamente por sus raíces y puede superar a otras flores silvestres en un jardín pequeño.

Espacie las plantas de 2 a 3 pies de distancia. Considere utilizarlas donde no le importe ver tallos y flores gastados después de una floración. Los tallos se pueden recortar a finales de primavera o principios de verano para fomentar un crecimiento más corto y tupido y más floración. Divida las plantas para utilizarlas en otro lugar.

Los jardineros pueden encontrar otras dos especies: Rayless sunflower (*H. radula*) y Lakeside sunflower (*H. carnosus*). Rayless sunflower no tiene flores de rayos amarillos soleados, solo cabezas de flores oscuras y violáceas en tallos de 2 a 3 pies en el otoño. A pesar de la falta de flores del rayo,

Rayless sunflower atrae a muchas abejas pequeñas y mariposas. Sus hojas también son inusuales — grandes, redondas, gruesas y relativamente planas sobre el suelo. Puede utilizar esta planta en suelos húmedos bien drenados desde el lago Okeechobee hacia el norte. Mezcle algunas con gramíneas ornamentales y otras flores silvestres para crear un contraste visual.

Lakeside sunflower florece desde finales de la primavera hasta el otoño con vistosas flores amarillas de 3 pulgadas con el centro amarillo verdoso. Los tallos de 1 a 3 pies nacen de una roseta basal de hoja perenne. Los jardineros del centro y norte de Florida pueden utilizarla en suelos de húmedos a mojados.

Utilice Rayless y Lakeside sunflowers en las zonas 8A-9B.



Rayless sunflower

Hay tres subespecies distintas de Dune sunflower: East

ADVERTENCIA

Coast dune sunflower, West Coast dune sunflower (*H. debilis* subsp. *vestitus*) y Cucumberleaf dune sunflower (*H. debilis* subsp. *cucumerifolius*). La mayoría de los viveros de plantas autóctonas deberían conocer la diferencia; otros viveros quizá no. Los jardineros concienciados con el medio ambiente que vivan en la costa deberían preguntar a su proveedor de viveros por la subespecie autóctona de su localidad. Esto ayudará a preservar las distintas identidades y funciones ecológicas de estas plantas.

Narrowleaf sunflower se distribuye de forma natural tan al oeste como Texas y tan al norte como Nueva York. Las tiendas grandes y los proveedores nacionales de semillas venden variedades procedentes de fuera del estado. Su rendimiento en su paisaje puede ser diferente al de los ecotipos de Florida.


  
 
 
1-3'
Néctar



Fourpetal St. John's wort

En Florida se encuentran treinta y una especies de hierba de San Juan (*Hypericum* spp.). Todas son autóctonas, y varias figuran en listas estatales y federales de plantas en peligro de extinción. En la naturaleza, busque la hierba de San Juan en hábitats arenosos y bosques planos, así como en los márgenes de pantanos y marismas de cipreses.

Las especies varían en el aspecto de sus hojas, pero sus tallos rojizos y sus deliciosas flores amarillas son constantes. Algunas tienen hojas cortas en forma de aguja, mientras que otras parecen pertenecer a un género completamente diferente.

Mariposas y abejas

Las especies de *Hypericum* atraen a las abejas de políéster, cara amarilla, carpinteras grandes, abejorros, cortadoras de hojas, resiníferas y sudoríferas, así como a las mariposas sedosa gris, cuyas orugas se alimentan de las cápsulas de sus semillas.

Descripción

La hierba de San Juan es un arbusto perenne de hoja perenne conocido por sus destacadas características ornamentales. Con ramitas robustas de color marrón rojizo, las especies de este género pueden alcanzar de 1 a 3 pies de altura y tienen extensiones de 2 pies o más. Las especies que se encuentran en los viveros autóctonos suelen tener flores amarillas de 1 pulgada con cuatro o cinco pétalos que contrastan con su follaje verde oscuro. Las plantas de la mayoría de las especies florecen en verano.

Atlantic St. John's wort (*H. tenuifolium*) es la especie más típica que se encuentra en viveros y ventas de plantas. Le gustan los suelos de secos a húmedos y no suele necesitar poda, manteniendo una forma encantadora de montículo. Sus floraciones



St. Andrew's cross

de verano duran un mes o más. St. Andrew's cross (*H. hypericoides*) que se encuentra en la naturaleza en zonas de sombra húmeda, tiene una forma elegante y plumosa y produce flores en tres estaciones. Para una adición vistosa al jardín, considere las hierbas Fourpetal St. John's wort (*H. tetrapetalum*), que tiene flores más grandes, de cuatro pétalos; y Myrtleleaf St. John's wort (*H. myrtifolium*), que tiene follaje azul verdoso y flores de color amarillo intenso.

Plantación

La hierba de San Juan puede utilizarse como planta de base, a lo largo de un límite o borde, o en una plantación masiva. Espacie las plantas de 24 a 36 pulgadas de distancia.

Semillas

Las semillas de ecotipos autóctonos no están disponibles comercialmente, pero se pueden recoger de las plantas cuando están secas. Siembre directamente en el jardín en otoño para que crezca en primavera.

Plantas

Las plantas se venden en recipientes de 1 galón.



Myrtleleaf St. John's wort

Cuidado

Estas plantas perennes resistentes son fáciles de cuidar una vez establecidas. Una poda ligera en el invierno, si es necesario, es todo lo que necesitan las plantas establecidas para mantener la forma deseada. Dele de beber a las especies de los humedales después de unos días sin lluvia.

Condiciones del sitio

La hierba de San Juan se cultiva mejor a pleno sol o a sombra parcial en suelos arenosos. Sin embargo, pueden adaptarse a una gran variedad de suelos, incluidos los arcillosos y limosos, y los suelos ácidos y ligeramente alcalinos. Las plantas no toleran la sal y toleran moderadamente la sequía una vez establecidas. Mantenga húmeda la hierba Myrtleleaf St. John's wort, una especie de humedal, añadiéndola a un jardín de lluvia o a un sitio húmedo.

Zonas de rusticidad

La mayoría de las especies de hierba de San Juan son adecuadas para las zonas 8A-10B, aunque el límite meridional de St. Andrew's cross es 9B.



Atlantic St. John's wort

ADVERTENCIA

La hierba de San Juan que se promociona como suplemento para el tratamiento de la depresión es una especie no autóctona. Según Dan Austin en su libro Florida Ethnobotany, el uso de la hierba de San Juan autóctona puede provocar dermatitis o fotosensibilidad debido a un compuesto de hipericina que se encuentra en las plantas.

Algunas especies pueden ser tóxicas para el ganado.



Dense blazing star

Los jardineros de Florida encontrarán cuatro especies autóctonas de *Liatris* en el mercado: Chapman's blazing star (*Liatris chapmanii*), Dense blazing star (*L. spicata*), Evergreen blazing star (*L. laevigata*) y Graceful blazing star (*L. gracilis*). Estas especies se encuentran en toda Florida.

Blazing stars o estrellas ardientes han sido durante mucho tiempo una de las flores favoritas en los ramos de flores. Las flores comienzan a abrirse en la parte superior del tallo y siguen floreciendo tras el corte.

Los nativos americanos utilizaban estas plantas para tratar diversas enfermedades, y los investigadores han descubierto sustancias anticancerígenas en varias especies. Los herboristas modernos utilizan las plantas para remedios homeopáticos y en popurrís y repelentes de insectos.

Descripción

Las estrellas ardientes son unas de nuestras flores silvestres perennes más altas, y suelen medir de 2 a 4 pies. Uno o varios tallos florales surgen de las rosetas basales en verano, y las flores aparecen desde finales del verano hasta el otoño, dependiendo de la especie. Esta es una flor silvestre caducifolia que pasa el invierno bajo tierra y emite tallos a partir de un rizoma engrosado en forma de cormo, que se asemeja a bulbos subterráneos. El follaje tiende a ser fino o poco llamativo. Sin embargo, Evergreen blazing star mantiene una roseta basal visible en el invierno.

Chapman's blazing star florece desde agosto hasta septiembre, con flores de color lavanda claro. Dense blazing star, la especie más comúnmente disponible y la más alta, florece en color lavanda brillante desde octubre hasta principios de noviembre. Evergreen blazing star tiene flores de color lavanda entre septiembre y octubre. Graceful blazing star

tiene flores de color lavanda claro a brillante en octubre y noviembre.

Plantación

Las estrellas ardientes requieren poco espacio en el suelo y se pueden utilizar incluso en jardines pequeños. Aunque se puede plantar en cualquier momento del año, el mejor momento para hacerlo es la primavera, cuando las plantas salen de la latencia. Para proporcionar color estacional e interés vertical, coloque las plantas en grupos en parterres mixtos de flores silvestres y gramíneas ornamentales. Para prolongar la temporada de floración, plante más de una especie. La silueta delgada, rígida y erguida de la estrella ardiente se complementa con plantas de formas más redondas o extendidas, hojas anchas en tiras y flores de diferentes formas y tamaños.

Semillas

Las semillas están disponibles comercialmente. Para recolectar sus propias flores, espere a que adquieran un color bronceado claro y luzcan esponjosas, luego agite o cepille ligeramente las flores en un recipiente. Los aquenios marrones son las semillas.

Mariposas y abejas

Las estrellas ardientes son excelentes plantas de néctar y atraerán de forma fiable a numerosas mariposas, polillas, abejas y otros insectos polinizadores. Los colibríes también pueden néctar en las flores.

Plantas

Las estrellas ardientes están disponibles en contenedores de 4 pulgadas y galones. Espacie las plantas entre 12 a 15 pulgadas de distancia. Manténgalos regados hasta que vea nuevos brotes o empiecen las lluvias estacionales.

Cuidado

El entutorado sólo es necesario cuando las plantas han sido regadas o fertilizadas en exceso y están debilitadas por haber crecido demasiado rápido.

Corte los tallos sólo si es necesario, y con cuidado, porque las plantas se arrancan con facilidad. Por esta razón, tenga mucho cuidado al desherbar alrededor de ellos. Tal vez le convenga marcar las plantas para recordar dónde están en la primavera.

Tras la floración, los tallos muertos albergan insectos, una importante fuente de alimento

para las aves. Las aves también se alimentan de las semillas.

Condiciones del sitio

Todas las plantas enumeradas aquí necesitan pleno sol para una floración óptima y suelos bien drenados. Algunas estrellas ardientes son especialmente sensibles a la humedad persistente en el suelo. Chapman's blazing star prefiere la arena seca, muy bien drenada y profunda. Graceful y Evergreen blazing star se encuentran en colinas arenosas secas a húmedas y en bosques planos secos a mésico. No plante estas especies donde el suelo permanezca húmedo o mojado. Dense blazing star prefiere una situación húmeda-mojada, pero se adapta bastante bien y es sorprendentemente tolerante a la sequía.

Zonas de rusticidad

Chapman's, Dense, Evergreen and Graceful blazing star se pueden cultivar en las zonas 8A-11.

Otras especies

También puede encontrar Elegant blazing star (*L. elegans*) adecuada para arenas excepcionalmente profundas y bien drenadas en el norte y centro-norte de Florida.



Graceful blazing star



2-4'

Néctar

Las plantas de estrella ardiente no autóctonas suelen venderse en las tiendas minoristas y centros de jardinería. La semilla de la estrella ardiente vendida por vendedores fuera del estado no suele ser del ecotipo nativo de Florida.

ADVERTENCIA



Spotted beebalm

Spotted beebalm (*Monarda punctata*), también conocida como Dotted horsemint, ocurre al sur de los condados de Lee y Palm Beach en suelos arenosos secos que a menudo son sitios perturbados, como los bordes de las carreteras, pero también en bosques planos de pinos abiertos. Tolerancia moderadamente el rocío salino y puede encontrarse cerca del Golfo de México y a lo largo de la laguna de Indian River.

Es una buena flor cortada para arreglos frescos o secos. Las tribus nativas americanas utilizaban la planta para tratar una gran variedad de dolencias. Se puede preparar un té suave con las hojas.

Descripción

Spotted beebalm es una planta perenne que muere en el invierno en el norte de Florida, pero que puede conservar algo de follaje más al sur. Tiene tallos múltiples, casi en forma de arbusto, con una extensión de 2 a 4 pies y una altura de aproximadamente 3 pies. Puede crecer más alto con riego y fertilizante. Sus hojas de color verde brillante en forma de lanza forman un follaje atractivo que es perfumado como el orégano o el tomillo.

Los verticilos de flores son de color blanco cremoso a amarillo con manchas moradas, y están recubiertos de brácteas aún más vistosas de color lavanda a crema. Los verticilos se repiten varias veces en un mismo tallo. Debido a su altura y a su capacidad de propagarse fácilmente por semilla, debe utilizarse hacia el fondo del paisaje o en un lugar propio.

Plantación

Como planta perenne, el Spotted beebalm rebrotará cada año y puede dividirse para producir más plantas en primavera, cuando hay nuevo crecimiento (las plantas pueden ser demasiado leñosas para dividirlos en verano u otoño). Se resiembrará fácilmente en el jardín. Las plantas deben estar a una distancia de 2 a 3 pies. No amontone las plantas; permita



Cola de golondrina cebra en Spotted beebalm

una buena circulación del aire. Cubrir con mantillo puede ayudar a reducir la cantidad de plántulas no deseadas.

Semillas

Las semillas están disponibles comercialmente, o recoja sus propias semillas después de que la floración haya terminado y los tallos se estén secando. Las semillas, o núculas, se encuentran en el cáliz, en la base de la flor. Busque semillas casi negras del tamaño de las semillas de amapola como señal de madurez. Para recogerlas, corte y agite los tallos en un recipiente.

Mariposas y abejas

Spotted beebalm es conocido como la flor silvestre de Florida que mejor atrae a un gran número de polinizadores. Desde el verano hasta el otoño, las vistosas flores atraen a las mariposas y a una gran variedad de insectos que no suelen verse en ninguna otra estación, entre ellas muchas especies de abejas autóctonas. Los colibríes también lo utilizan.

Plantas

Las macetas de cuatro pulgadas a 1 galón están disponibles.

Cuidado

Spotted beebalm es bastante resistente a la sequía, pero durante las sequías prolongadas de primavera puede necesitar un poco más de agua.

A principios de verano, las plantas pueden podarse para reducir la altura y seguir produciendo flores. Recortar los tallos florales cerca del final de la floración también puede ayudar a alargar el período de floración. Los tallos que sobran son beneficiosos para los

insectos y los pájaros, pero pueden recortarse hasta el crecimiento emergente si se desea mantener el orden.

Spotted beebalm contiene una sustancia química llamada timol que ayuda a prevenir las enfermedades fúngicas y bacterianas, por lo que está relativamente libre de problemas.

Condiciones del sitio

A pleno sol florecerá mejor, pero también a sombra parcial. Spotted beebalm se da mejor en suelos arenosos y bien drenados. Puede tolerar algo de humedad, pero cuando dispone de más nutrientes o agua, es probable que la planta crezca más e incluso se caiga, por lo que será necesario recortarla o entutorarla. En condiciones húmedas, puede ser susceptible a los ataques de hongos.

Zonas de rusticidad

Spotted beebalm se adapta mejor a las zonas 8A-10A.



Nacarada del golfo en Spotted beebalm

Esta especie crece en todo el este de los Estados Unidos y en Canadá. Para obtener el mejor rendimiento del paisaje, tenga cuidado y compre plantas que sean ecotipos autóctonos de Florida.

ADVERTENCIA


1-3'
Néctar



Silver-leaved aster

Silver-leaved aster (*Pityopsis graminifolia*), también conocida como Grass-leaved goldenaster o Narrowleaf silkgrass, se encuentra en toda Florida en ecosistemas de matorrales, colinas de arena y bosques planos.

La especie tiene cinco variedades, dos o más de las cuales pueden ser ofrecidas por viveros autóctonos. Tracy's silver-leaved aster (*Pityopsis graminifolia* var. *tracyi*) se puede encontrar en todos los hábitats, aunque principalmente en bosques planos. Forma una cubierta vegetal corta y plateada y suele verse en las laderas superiores de muchos bordes de carretera. Sandhill silver-leaved aster (*P. graminifolia* var. *aequifolia*) normalmente sólo se encuentra en suelos más secos de colinas arenosas y matorrales. Florece más tarde que la mayoría de las otras flores silvestres otoñales, proporcionando color hasta finales del otoño y principios del invierno.

Descripción

Silver-leaved aster es un nombre apropiado, ya que las hojas están cubiertas de pelos sedosos que le dan un aspecto plateado. A primera vista, la planta puede parecer una hierba. Es una planta perenne con rizomas cortos o largos, dependiendo de la variedad, y mide menos de un pie de altura hasta el otoño, cuando echa tallos floridos de hasta 3 pies de altura. Sus flores amarillas en forma de aster pueden florecer hasta noviembre y diciembre, e incluso más tarde en el sur.

Tracy's silver-leaved aster se propaga a partir de rizomas para formar una densa cubierta vegetal y tiene flores de más de 1 pulgada de diámetro en las puntas de los tallos ramificados con hojas cortas y aplanadas. Esta variedad, con su capacidad de propagación, puede convertirse con el tiempo en una cubierta vegetal plateado muy agradable. Sandhill silver-leaved aster crece como una sola mata con flores más pequeñas



Flor vuela en Silver-leaved aster

en las puntas de los tallos que tienen hojas extendidas más largas hasta la parte superior. Se puede mezclar con otras flores silvestres que ofrecen una gran variedad de colores y épocas de floración.

Mariposas y abejas

Silver-leaved aster atrae mariposas y varios polinizadores como planta de néctar.

Plantación

Aunque algunas variedades se propagan, la *Pityopsis* no se resiembrar con tanta facilidad como otras flores silvestres, como la *Coreopsis* y *Spotted beebalm*. Silver-leaved aster es relativamente fácil de establecer y mantener a lo largo del tiempo, sobre todo si es una



Silver-leaved aster en un paisaje

de las variedades que se esparcen. Las variedades más rizomatosas también pueden dividirse y plantarse en nuevas zonas.

Las plantas se pueden establecer en cualquier época del año en contenedores si se riegan bien después de plantarlas y se continúa regando según sea necesario hasta que se establezcan o hasta bien entrada la temporada de lluvias. Sepárelos a 2 pies de distancia — más cerca si utiliza Tracy's silver-leaved aster para crear una cubierta vegetal rápidamente al esparcirse.

Semillas

Recoge las cabezas de las semillas una vez que la cabeza haya terminado de florecer y la semilla se haya esponjado. Es posible que haya que sembrar las semillas bastante pronto en los meses de invierno, porque no son viables por mucho tiempo.

Plantas

Las plantas suelen estar disponibles en cuartos o galones en los viveros de plantas autóctonas.

Cuidado

Una vez que las plantas hayan florecido, recorte los tallos en flor al nivel del suelo. Incluso puede segar en áreas donde el Tracy's silver-leaved aster se ha utilizado para hacer una cubierta vegetal esparcidor. Utilice cuchillas bien afiladas, ya que los tallos y las hojas son bastante duros.

Condiciones del sitio

La planta prefiere pleno sol a sombra ligera y suelos bien drenados a suelos arenosos secos. Evite las plantaciones muy sombreadas o apiñadas. Las distintas variedades pueden requerir condiciones de cultivo diferentes; pregunte por el origen de la planta.

Zonas de rusticidad

Silver-leaved aster se adapta mejor a las zonas 8A-11.

Las distintas variedades de Silver-leaved aster no son bien conocidas, ni siquiera por los cultivadores nativos, así que pregunte por las características de crecimiento cuando compre plantas u obtenga material vegetal de un amigo.

ADVERTENCIA

Black-eyed Susan





1-4'
Huésped larvario, néctar



Marca de metal pequeña en Black-eyed Susan

Las especies de *Rudbeckia* se conocen comúnmente con el nombre de Black-eyed Susans o coneflowers. La autóctona más ampliamente disponible es Black-eyed Susan (*Rudbeckia hirta*). Se encuentra en toda Florida en colinas de arena, bosques planos y áreas perturbadas, incluso la variedad de *Rudbeckia hirta* var. *floridana*, endémica del centro y sur de Florida.

Softhair coneflower (*R. mollis*) y Cutleaf coneflower (*R. laciniata*) se pueden utilizar con éxito en todo el Panhandle y en el norte y centro de Florida.

Descripción

Black-eyed Susan, especialmente la variedad que se encuentra en el centro y sur de Florida parece ser perenne. Sin embargo, las variedades pueden ser anuales, bienales o perennes. Las plantas suelen medir de 1 a 2 pies de altura, con la mayor parte del follaje en la mitad inferior. Las hojas son muy ásperas al tacto (lo que puede ayudar a identificar las plantas jóvenes). Las flores de 3 a 4 pulgadas de color amarillo intenso, parecidas a un áster, tienen flores en forma de disco de color marrón oscuro en una cúpula central. *Rudbeckia* florece desde la primavera hasta el otoño, y tiene floraciones dispersas durante el invierno en el sur de Florida.

Softhair coneflower es anual o bienal, con pelos suaves, casi aterciopelados, en plantas que alcanzan 3 pies o más cuando florecen. Las cabezas florales de 2½ pulgadas son similares a las de Black-eyed Susan. Tienen vistosos flósculos de rayos, pero el disco es aplanado y marrón o violáceo. Softhair coneflower es una planta robusta que puede tener 30 flores abiertas a la vez desde finales de la primavera hasta el verano. Se encuentra de forma natural en colinas arenosas y bosques abiertos de madera dura, así que plántela en suelos arenosos y bien drenados, y mézclela con otras especies donde su altura sea una adición bienvenida al paisaje.

Cutleaf coneflower es una planta perenne de gran tamaño que alcanza entre 4 a 6 pies de

altura y hasta 4 pies de ancho cuando florece a finales de verano y otoño. Esta especie, que se encuentra en bosques de madera dura húmedas y abiertas y en llanuras aluviales del norte de la Florida, prefiere entornos húmedos y puede necesitar un poco más de sombra o protección del sol occidental cuando se utiliza en la Florida central. Las hojas inferiores están dentadas y profundamente disecadas. Las flores grandes se sitúan de 2 a 4 pies por encima de las últimas hojas y tienen flósculos de rayos amarillos largos que se extienden desde el disco en forma de montículo con flósculos de color amarillo verdoso. La hermosa roseta de grandes hojas de color verde intenso de la Cutleaf coneflower puede verse durante gran parte del año, por lo que constituye una buena plantación en masa.

Mariposas y abejas

Estas plantas son excelentes fuentes de néctar y también hospedan larvas de algunas polillas.

Plantación

Utilice Black-eyed Susans en parterres mixtos de flores silvestres. Tanto ésta como la mayoría de las otras especies de *Rudbeckia* se auto-siembran fácilmente si se disponen de áreas abiertas o áreas ligeramente cubiertas de mantillo.

Espacie los Black-eyed Susans y Softhair coneflower a una distancia de 14 a 18 pulgadas. Separe Cutleaf coneflower a una distancia de 3 pies.

Semillas

Las semillas pueden recolectarse después de que las flores de rayos y discos terminen de florecer y se hayan secado ligeramente. Recoja una cabeza y rómpala para encontrar las semillas maduras en forma de cono, que deben tener centros blancos sólidos.



Black-eyed Susan

Las semillas se pueden comprar comercialmente.

Plantas

Las plantas están disponibles en contenedores de un galón en viveros autóctonos. Cuando compre en tiendas minoristas convencionales, asegúrese de preguntar por el origen de la planta (vea Advertencia).

Cuidado

Vigile las plantas durante los periodos de sequía más prolongados, sobre todo en la primavera, y riegue abundantemente sólo cuando sea necesario. Las flores de Black-eyed Susan pueden cortarse después de que florezcan para fomentar la floración de más tallos y prolongar el periodo de floración.

Condiciones del sitio

Esta planta se adapta bien a muchos tipos de suelo, siempre que el lugar esté bien drenado y no sea extremadamente seco. Dé a la *Rudbeckia* pleno sol o sombra parcial para que florezca mejor.

Zonas de rusticidad


Black-eyed Susan se adapta mejor a las zonas 8A–11. Softhair y Cutleaf coneflower son adecuadas para las zonas 8A–9A.



Softhair coneflower

Existen muchos cultivares de la especie *Rudbeckia*, algunos de los cuales son muy populares y ampliamente disponibles. Ninguno de los cultivares actualmente disponibles procede de ecotipos de Florida y no se consideran flores silvestres autóctonas. Puede que no rindan tan bien ni vivan tanto como los de su región

ADVERTENCIA



Wild petunia



Nacarada del golfo en Wild petunia

Wild petunia (*Ruellia caroliniensis*) es una planta autóctona fácil de cultivar, con flores de color lavanda a azul, que funciona bien en la mayoría de las condiciones. Es endémica del este de los Estados Unidos, donde su área de distribución se extiende desde Nueva Jersey hacia el sur y el oeste hasta Texas. En Florida, se encuentra en colinas de arena, bosques planos, y bosques de madera dura húmedas a mojadas en aproximadamente 52 condados. Hay cinco especies de *Ruellia* autóctonas de Florida, pero *R. caroliniensis* es la más común, tanto en la naturaleza como comercialmente. Otras especies incluyen Ciliate wild petunia (*Ruellia ciliosa*) y Thicketleaf wild petunia (*Ruellia succulenta*), endémica del sur de Florida. Una especie no autóctona de *Ruellia* está disponible para la venta, pero no debe utilizarse ya que es invasora. (Vea Advertencia.)

Descripción

Wild petunia es una planta perenne de larga vida que puede alcanzar una altura de 12 a 18 pulgadas. Sus flores de 5 pétalos son tubulares, crecen entre 1 y 2 pulgadas y aparecen en racimos a lo largo de tallos con múltiples ramas. Se parece a la petunia de jardín común, aunque no están relacionadas. Sus hojas simples son verdes, de forma ovada a elíptica y están dispuestas de forma opuesta en los tallos. *R. caroliniensis* se distingue fácilmente de otras especies de *Ruellia* por los sépalos largos y puntiagudos y las brácteas que rodean la base de la flor.

Las vistosas flores de Wild petunia duran sólo un día, pero las floraciones sucesivas mantienen el aspecto fresco de la planta con flores continuas de primavera a otoño. En las zonas más cálidas del estado, puede florecer todo el año con flores más pequeñas. En climas más fríos, Wild petunia puede morir en invierno y regresar en primavera.

Plantación

Wild petunia se da bien en un parterre mixto de plantas silvestres y gramíneas. En el norte de Florida, no se recomienda para una plantación masiva, ya que será un parche de

tallos durante el invierno.

Plante Wild petunia con una separación de 12 a 15 pulgadas, o cultívela en una cesta colgante o en una maceta grande con buen drenaje. Wild petunia es una de las pocas flores silvestres que florecen en sombra parcial a ligeramente densa.

Semillas

Por lo general, las semillas no están disponibles comercialmente. Para cultivar esta planta a partir de semillas, recoja las cápsulas maduras en una bolsa de papel a mediados o finales del verano. Las semillas maduran gradualmente en la planta a lo largo de varias semanas, por lo que hay que visitar las plantas varias veces para revisar las cápsulas. Cuando maduren, pasarán del verde brillante al marrón.

Mariposas y abejas

Varias especies de mariposas, entre ellas el pavo real blanco, la malaquita y Ojichivo del manglar recogen néctar de Wild petunia. Es una planta hospedadora de ojo de venado. Las corolas azules atraen a una gran variedad de abejas, como abejorros, abejas cortadoras de hojas y abejas melíferas.

Plantas

Las plantas están disponibles en los viveros de plantas autóctonas en varios tamaños de maceta y pueden plantarse durante toda la temporada de crecimiento.

Los esquejes de tallo también son una forma fácil de propagarla. Tome esquejes de 3 a 4 pulgadas en el verano de los tallos flexibles. Las plantas enraízan fácilmente en 3-4 semanas.

Cuidado

Wild petunia puede necesitar un recorte a mitad de su temporada de crecimiento para promover un nuevo crecimiento y floración.

Retire 3-4 entrenudos (4-6 pulgadas) con tijeras o tijeras de podar. Puede ser necesaria una poda anual para eliminar los tallos viejos.

Wild petunia es una auto-sembradora prolífica y puede formar colonias con el tiempo. (Al igual que otros miembros de la familia Acanthaceae, sus cápsulas de semillas maduras estallan al abrirse, enviando semillas lejos de la planta madre). Las plantas tienen un sistema de raíces fuerte, por lo que son fáciles de trasplantar.

Condiciones del sitio

Esta planta se adapta bien a condiciones variadas de sol y humedad del suelo. Prospera en un lugar soleado entre moderado y seco, pero también tolera la sombra e incluso los suelos húmedos y mugrientos. Si se instala Wild petunia en lugares más sombríos, las plantas parecerán más larguiruchas y florecerán menos. Las plantas tienen cierta tolerancia a la sal.

Zonas de rusticidad

Wild petunia se adapta mejor a las zonas 8A-10B.



Wild petunia es mejor en una plantación mixta.

Aunque la industria de viveros ofrece algunas *Ruellia* no autóctonas estériles, debe evitarse la

ADVERTENCIA

muy difundida petunia mexicana (*Ruellia simplex*; sinónimos *R. brittoniana* y *R. tweediana*), ya que puede reproducirse a través de rizomas subterráneos. Como especie exótica invasora de categoría I, se ha extendido a zonas municipales y naturales, desplazando a las especies autóctonas y cambiando las estructuras comunitarias o las funciones ecológicas.

6-36 "
Néctar



Tropical sage

Los jardineros de Florida suelen encontrar tres especies autóctonas de *Salvia*. Scarlet o Tropical sage (*Salvia coccinea*) es la salvia que se encuentra con más frecuencia y se da en todo el estado (con la excepción de los Cayos) en áreas con suelos húmedos y bien drenados. Lyreleaf sage (*Salvia lyrata*) se da en toda Florida, al sur de los condados de Broward y Lee, en suelos húmedos en los bordes de los bosques o en áreas abiertas. Creeping o Southern river sage (*Salvia misella*) se da en bosques húmedos de semi-sombra desde el condado de Alachua hacia el sur hasta los condados de Miami-Dade y Monroe. Todas son fuentes de néctar para las mariposas.

La *Salvia* tiene una larga historia de usos medicinales. Al triturar el follaje, detectará una fragancia tenue hierbal.

Descripción

Scarlet sage es una planta perenne de corta vida que persiste en el paisaje por auto-siembra. Suele alcanzar entre 18 a 36 pulgadas de altura y es más alta que ancha. La floración se produce durante todo el año



Siembra en la frontera de Creeping sage



Lyreleaf sage

en el sur de Florida, y desde el verano hasta el otoño en el centro y el norte de Florida. Las flores, abundantes, miden 1 pulgada de largo y suelen ser de color coral oscuro o rojo como un camión de bomberos, aunque también se presentan formas rosadas y blancas. Los tallos cuadrados de la planta son de color verde a marrón oscuro.

Lyreleaf sage es una planta perenne que, durante gran parte del año, consta de hojas relativamente planas y abigarradas que muestran una gama de verdes, violetas oscuros y marrón chocolate. Las flores de color violeta claro aparecen en tallos de color verde oscuro o borgoña a finales del invierno o principios de la primavera. Los tallos alcanzan de 12 a 24 pulgadas o más de altura, dependiendo de la humedad, los nutrientes y la luz disponible.

Creeping sage es una cubierta vegetal de hoja perenne y bajo crecimiento de 6 a 8 pulgadas de altura. La floración se produce de forma intermitente durante todo el año, con flores diminutas y abundantes de color azul. Las flores no se ven desde lejos, pero el follaje verde claro es muy atractivo. Las plantas salen de un tallo central.

Plantación

Utilice Scarlet sage en la parte central de un parterre mixto de flores silvestres o como un acento por sí misma. Separe las plantas de 1 a 2 pies de distancia y resista la tentación de plantar en masa — se auto-siembran fácilmente y se extenderán por todo el jardín.

Plante Lyreleaf sage en grupos pequeños, con plantas individuales separadas aproximadamente un pie. Algunos cultivadores la han establecido con éxito como una cubierta vegetal que se extiende después de dos o tres años de cultivo en un paisaje.

Creeping sage es una buena elección para espacios estrechos y bajo los árboles, donde puede plantarse entre las raíces. Tolerancia al tráfico peatonal ligero. Espacie las plantas

de 6 a 8 pulgadas de distancia.

Semillas

Scarlet y Lyreleaf sage se cultivan fácilmente a partir de semillas. Para recolectar las tuyas, deje que las flores se sequen en los tallos y agítelas suavemente en un recipiente para quitar las flores y obtener las semillas.

Plantas

Las plantas están disponibles en contenedores de 4 pulgadas a 1 galón.

Cuidado

Para una floración continua, corte las plantas de Scarlet sage después de que las flores se hayan gastado. Lyreleaf sage se puede segar a finales de primavera o principios de verano, después de que semilla. Creeping sage puede recortarse una o dos veces en verano. Lyreleaf y Creeping sage pueden necesitar agua si se plantan a pleno sol o durante sequías prolongadas.

Mariposas y abejas

Las *Salvias* son excelentes fuentes de néctar para mariposas y abejorros. También atraen a los colibríes.

Condiciones del sitio

Scarlet sage se da mejor en suelos arenosos húmedos y bien drenados, a pleno sol o sombra dispersa. Puede tolerar algo de rocío salino.

Lyreleaf sage prefiere el suelo húmedo y la sombra parcial, pero tolera el pleno sol.

Creeping sage crece bien en sombra brillante y prefiere los suelos húmedos. Tolerancia al pleno sol, pero puede estresarse con el calor y el frío.

Zonas de rusticidad

Las especies de *Salvia* se adaptan mejor a las zonas 8A-10B.

Muchas salvias no autóctonas se venden en

centros de jardinería y otros grandes establecimientos minoristas, con una identificación mínima.

ADVERTENCIA



Helmet skullcap

Para una flor silvestre tan diminuta, Helmet skullcap (*Scutellaria integrifolia*) tiene un gran impacto cuando florece a finales de primavera y en verano. También conocida como Common skullcap, es ideal para un borde de flores silvestres o enclavada en un estanque o jardín de rocas. Aunque es una planta perenne de corta vida, su adaptabilidad está contribuyendo a su popularidad entre los jardineros domésticos. *Scutellaria* significa plato en latín, lo que posiblemente describa el pétalo inferior en forma de plato; e *integrifolia* hace referencia a los márgenes lisos de sus hojas.

La distribución natural de la *Scutellaria* se extiende por toda Florida excepto el extremo sur. Se encuentra con frecuencia en la región del Panhandle y en el norte y centro de Florida, en los suelos húmedos de las colinas arenosas, los bosques planos de pinos y los bosques mixtos de tierras altas, así como a lo largo de los bordes de marismas y pantanos. Skullcap también se encuentra en la mayor parte del este de los Estados Unidos.

Una especie estrechamente relacionada, Florida scrub skullcap (*Scutellaria arenicola*) se distingue por los márgenes de sus hojas crenadas. Las otras nueve especies nativas de skullcap de Florida sólo se encuentran rara u ocasionalmente en sus hábitats.

Description

Helmet skullcap es una planta perenne de 12 a 24 pulgadas que muere en el invierno. Comienza como una roseta basal de hojas verdes brillantes, en forma de flecha, con márgenes toscamente dentados. De la roseta surgen muchos tallos ramificados. Las hojas del tallo varían de elípticas a forma de flecha y están dispuestas de forma opuesta. Las hojas superiores están más estrechas y tienen los márgenes enteros.

Las flores tienen dos labios y se parecen a las flores de boca de dragón. Se presentan en racimos terminales y son muy vistosas, con colores que van del azul cielo al violeta. El labio inferior consta de tres lóbulos fusionados



Sedosa gris en Helmet skullcap

con centros salpicados de blanco que se extienden por la garganta. Una franja oscura guía a los insectos hacia el néctar deseado. Los pétalos superiores están fusionados y curvados, formando una pequeña capucha o estructura en forma de casco. Las flores nacen en las axilas de las hojas superiores en forma de bráctea.

Mariposas y abejas

Las flores de Helmet skullcap son visitadas por una gran variedad de abejas cuyos cuerpos caben entre los labios inferiores y superiores para alcanzar el néctar. Esto incluye a las abejas cortadoras de hojas, cardadoras y cucullillas, así como a algunos abejorros. También se sabe que las abejas sudoríparas visitan Helmet skullcap, pero son ladronas de néctar y perforarán la base de la corola para acceder al néctar. Como muchas otras especies de la familia Lamiaceae (menta), las mariposas sólo visitan esporádicamente las flores de Helmet skullcap. Las especies conocidas por utilizar Helmet skullcap incluyen nacarada del golfo en, y las cola de golondrina de spicebush y cometa negra Eastern.

Plantación

Esta pequeña y encantadora flor silvestre puede introducirse en su jardín en cualquier momento utilizando plantas o semillas. Produce una gran cantidad de semillas y plántulas, por lo que las plantaciones aumentarán de tamaño de forma natural y rápida.

Semillas

Las semillas son pequeñas, brillantes y negras y se producen en núculas. Actualmente no están disponibles comercialmente. Las semillas están maduras cuando la cubierta

de los frutos secos adquiere un color marrón claro y se vuelve de textura de papel. La planta puede contener flores y semillas al mismo tiempo. Las semillas secas pueden almacenarse hasta seis meses y luego sembrarse cuando las temperaturas alcancen los 70 grados. La germinación puede tardar hasta 30 días.

Plantas

Los viveros especializados en plantas autóctonas venden Helmet skullcap casi todo el año. Suele estar disponible en macetas de 4 pulgadas o 1 galón.

Cuidado


El exceso de plántulas se puede quitar fácilmente o trasplantarse a macetas pequeñas. Para evitar tener que eliminar las plántulas, pode las plantas después de la floración para limitar la producción de semillas. Las enfermedades y las plagas no son un problema para esta flor silvestre.

Condiciones del sitio


Apreciada por su floración temprana en primavera, Helmet skullcap es magnífica en la parte delantera de un parterre mixto de flores silvestres. Esta planta adaptable puede utilizarse en suelos de bien drenados a húmedos y se considera algo tolerante a la sequía. Un pH de 5-6.5 es ideal. Se adapta mejor a lugares soleados o ligeramente sombreados. Las plantas estarán latentes en el invierno, muriendo hasta la raíz. Helmet skullcap no tolera la sal.

Zonas de rusticidad

Helmet skullcap se adapta mejor a las zonas 8A–9B.



Nacarada del golfo en Helmet skullcap



Privet senna



Chapman's senna

Senna es un género de diversas plantas con flores nativas de los trópicos. Cuatro especies son autóctonas de Florida, y dos — *S. ligustrina* and *S. mexicana* var. *chapmanii* — se propagan comercialmente. Ambos son excelentes para atraer a los polinizadores y añadir un toque tropical al paisaje doméstico.

Senna mexicana var. *chapmanii* se conoce comúnmente como Chapman's wild sensitive plant, Chapman's senna y Bahama senna. Se da en tierras rocosas de pinos, cordones costeros y a lo largo de los bordes de bosques de madera dura en el condado de Miami-Dade y los Cayos de Florida. Sin embargo, puede plantarse en paisajes tan norteños como la Florida Central. Debido a su área de distribución natural limitada, es una especie amenazada incluida en la lista estatal.

Privet wild sensitive plant o Privet senna (*S. ligustrina*) se da de forma natural en los condados costeros desde Brevard hacia el sur en la costa este, y desde Gilchrist y Levy hacia el sur en la costa oeste. Puede encontrarse a lo largo de los bordes de bosques de madera duro y en áreas perturbadas.

Descripción

Con una abundancia de vistosas flores amarillas y un reluciente follaje de hoja perenne, tanto Privet como Chapman's senna son plantas ornamentales excepcionales. Chapman's senna es una planta perenne robusta de hoja perenne que puede adoptar diversas formas, desde erguida hasta casi postrada y extendida. Sus flores tienen pétalos brillantes de color mantequilla amarilla con una venación sutilmente roja. Nacen en racimos de tallos en primavera y otoño.

Privet senna es un arbusto de crecimiento rápido que puede alcanzar una altura de 10 pies o más. Es larguirucho, con una copa fina y muchas ramas laterales cortas. Si se deja auto-sembrar, puede formar una colonia densa. En la madurez, el Privet senna tiende a doblarse por su propio peso. Sus flores son de color amarillo limón. Su follaje es similar al de Chapman's senna, con hojas compuestas pinnadas que están dispuestas

alternativamente, pero sus folíolos son lineales a lanceolados y más numerosos. En general, su follaje es menos denso. El Privet Senna suele florecer desde el otoño hasta finales de la primavera, pero puede hacerlo esporádicamente a lo largo del año.

Mariposas y abejas

Las flores *Senna* son visitadas por abejas sudoríparas, resiníferas, cucullas, cortadoras de hojas y abejorros para obtener su polen y néctar. Mariposas como la anaranjada dormilona, amarilla pequeña y azufre común, el azufre de barras naranjas y el azufre estatira también son visitantes frecuentes. Todos los miembros del género *Senna* son plantas hospedadoras de larvas de orugas azufreras.

Plantación

Ambas especies pueden utilizarse como arbustos ejemplares, pero Chapman's senna funciona mejor plantado en masa y como borde.

Semillas

Las semillas de *Senna* no suelen estar disponibles comercialmente. Ambas especies son auto-sembradoras prolíficas. Las semillas suelen brotar en la primavera.

Plantas

Las plantas de ambas especies están disponibles en macetas de 1 y 3 galones en los viveros de plantas autóctonas.

Cuidado

Sennas no toleran el frío y pueden morir si se exponen a temperaturas bajo cero. Las plántulas son ligeramente más resistentes y pueden sobrevivir. Sennas requieren podas ocasionales; de lo contrario, pueden volverse

demasiado largas. La eliminación de las vainas de semillas marrones ayudará a que las plantas sigan siendo atractivas cuando no estén en flor y ayudará a disminuir las plántulas. Las plántulas no deseadas se pueden quitar fácilmente.

Condiciones del sitio

Plante el Privet senna y el Chapman's senna en suelos secos a ligeramente húmedos y bien drenados. Ambas pueden tolerar suelos pobres en nutrientes, pero se dan mejor con cierto contenido orgánico. Lo mejor para ambas especies es el sol pleno o la sombra ligera. El Privet senna puede tolerar un poco más de sombra que el Chapman's — hasta medio día — pero ninguno de los dos florecerá sin varias horas diarias de luz solar directa. A pesar de ser nativo de las zonas costeras, el Privet senna no tolera la sal, aunque el Chapman's senna sí la tolera.

Zonas de rusticidad


Privet senna es adecuada para la zona 9A–11; Chapman's senna para las zonas 10A–11.



Azufre comun oruga en Privet senna

Muchas especies de *Senna* no autóctonas se venden comercialmente. En particular, Christmas senna o Butterfly senna (*S. pendula*) se recomienda a menudo para los jardines de mariposas. Sin embargo, el Florida Invasive Species Council (FISC) la clasifica como especie invasora de categoría I, conocida por alterar las comunidades de plantas autóctonas. Debe evitarse. Para más información sobre Butterfly senna, visite el sitio web del FISC: www.FloridaInvasiveSpecies.org.

ADVERTENCIA



Starry rosinweed



Bigleaf rosinweed

La Florida cuenta con dos especies autóctonas de *Silphium*, ambas de follaje y flores robustas. El nombre común tradicional de estas plantas es rosinweed. Recientemente se han adoptado nuevos nombres comunes para eliminar cualquier idea errónea de que estas hermosas plantas son malas hierbas. Starry rosinweed (*Silphium astericus*) ocurre en bosques planos, colinas de arena y áreas perturbadas en el Panhandle y la península central occidental hacia el sur hasta el condado de Lee. Bigleaf rosinweed (*Silphium compositum*) ocurre en los bosques planos del Panhandle y los condados del norte hasta el condado de Pasco en el sur.

Los tallos de la Rosinweed contienen una sustancia gomosa o resinosa. Los nativos americanos masticaban tallos para limpiarse los dientes. Los Cherokees también utilizaban las plantas con fines medicinales.

Descripción

Starry rosinweed es una planta perenne que puede morir en el invierno, sobre todo si hace frío. Luce nuevo follaje en primavera y puede producir flores desde mediados de primavera hasta principios de otoño, e incluso durante el invierno si las temperaturas son suaves. Los tallos en flor pueden alcanzar de 3 a 5 pies, con plantas de unos 2 pies de diámetro. Las hojas lanceoladas y dentadas se extienden

por todo el tallo hasta los escapos en flor, donde los tallos se ramifican para sostener numerosas cabezas florales. Las cabezas florales de 2 pulgadas tienen pétalos de rayos y discos amarillos. Esta especie es especialmente apreciada, ya que florece durante un largo periodo de tiempo.

Bigleaf rosinweed también es una planta perenne, pero muere en el invierno. Emerge en primavera con unas hojas basales muy singulares — son casi redondas, profundamente disecadas, de color verde oscuro, con venas rojas y de 4 a 12 pulgadas de diámetro. Los tallos en flor pueden alcanzar los 6 pies y tienen unas cuantas hojas diminutas esparcidas por el tallo, que se ramifica cerca de la parte superior. Las flores son ligeramente más pequeñas que las de Starry rosinweed, con pétalos de rayos amarillos que rodean discos rojizos, y florecen hacia finales del verano. Como los tallos no son frondosos y sólo tienen flores en la parte superior, coloque las plantas donde también pueda apreciarse el hermoso follaje basal.

Mariposas y abejas

Ambas especies atraen mariposas, abejas autóctonas y otros polinizadores. Las aves se comen las semillas.

Plantación

Separe las plantas a una distancia de 2 pies. Dado que ambas especies pueden tolerar cierta sequía, riegue profunda y abundantemente para mojar el suelo al menos a 7 pulgadas de profundidad hasta que la planta esté establecida, pero sólo con la frecuencia necesaria. Como plantas perennes, ambas especies persisten en el paisaje y pueden sembrarse por sí solas.

Semillas

Las semillas de Starry rosinweed están disponibles comercialmente; también puede recoger sus propias semillas cuando

las cabezas de las flores estén secas. Rómpalas para separar las semillas. Para obtener los mejores resultados, plante las semillas poco después de la recolección y mantenga la superficie del suelo húmeda. La germinación ocurre en aproximadamente 3 semanas. Para una germinación más rápida, estratifique las semillas en frío manteniéndolas húmedas y refrigeradas en un medio de plantación durante 30 días. Comenzarán a brotar en 4 días y completarán la germinación en 2 semanas.

Plantas

Ambas especies pueden encontrarse en viveros en macetas de 1 galón, pero la Bigleaf rosinweed no está ampliamente disponible.

Cuidado

Una vez establecidas en el suelo adecuado, las plantas no deberían necesitar agua adicional, pero vigile las sequías muy prolongadas, sobre todo en primavera, y riegue según sea necesario. Si se desea, las plantas pueden podarse después de la floración. En Starry rosinweed, corte sólo la parte que florece, dejando los tallos frondosos. Recorte Bigleaf rosinweed hasta sus hojas basales.

Condiciones del sitio

Aunque el área de distribución natural de Starry rosinweed es el oeste de la península, se da bien en gran parte del estado. Es bastante resistente a la sequía y también se da bien en suelos húmedos. Necesita de pleno sol a sombra parcial para una buena floración.

Bigleaf rosinweed es incluso más tolerante a la sequía que Starry rosinweed y se da bien en suelos secos y arenosos. También tolera suelos húmedos y bien drenados, pero puede crecer más alta en esas condiciones. Necesita pleno sol para una floración óptima.

Zonas de rusticidad

Starry rosinweed y Bigleaf rosinweed son adecuados para las zonas 8A–10B.



Starry rosinweed

Dado que ambas especies de *Silphium* se dan al norte de los estados del medio Atlántico, es importante comprar plantas que se hayan propagado a partir de la progenie de Florida para obtener el mejor rendimiento.

ADVERTENCIA



3-4'

Néctar



Seaside goldenrod

Seaside goldenrod (*Solidago sempervirens*) suele ser la más disponible de las cuatro goldenrods o varas de oro autóctonas que se cultivan comercialmente. Esta planta florece en masas muy vistosas en dunas, en zanjas y marismas salobres, en suelos arenosos de zonas costeras y, ocasionalmente, en el interior de todo el estado, excepto en los Cayos.

A menudo se culpa erróneamente a la vara de oro de provocar alergias, pero la culpa es de la ambrosía que florece mucho en la misma época.

Las varas de oro se han utilizado con fines medicinales desde la época romana o antes. Seaside goldenrod fue utilizada por los Seminole para tratar heridas.

Descripción

Seaside goldenrod tiene flores tubulares de color amarillo dorado que cubren densamente las largas inflorescencias en forma de varita en las puntas del tallo en el verano y el otoño en la mayor parte del estado, y también en la primavera en el sur de Florida. Esta planta perenne conserva sus hojas basales largas en forma de tira y algo carnosas durante todo el año. Las hojas se vuelven gradualmente más pequeñas a medida que ascienden por los tallos. Las plantas alcanzan de 4 a 6 pies de altura en flor y se propagan por rizomas hasta formar grandes colonias con el tiempo. Plántela en un lugar del jardín donde pueda lucirse o déjele un gran espacio en el paisaje.

Mariposas y abejas

Una variedad de mariposas y otros polinizadores se sienten atraídos por la vara de oro como planta de néctar. Las plantas también atraen a las aves en busca de insectos.



Azufre común en goldenrod

Plantación

Debido a su gran tamaño, separe las plantas 3 pies o más y deje que se llenen con el tiempo. Se propaga por rizomas hasta formar densos rodales de tallos robustos y es fácil de mantener en el paisaje.

Semillas

Recoja las semillas después de que las flores se pasen y aparezcan mechones esponjosos de pelillos. Se denominan "pappus" y se adhieren al extremo de las semillas. Las semillas también están disponibles comercialmente.

Plantas

Las plantas están disponibles en contenedores de un cuarto de galón, 1 galón y 3 galones. Se puede propagar mediante división.

Cuidado

Esta planta rinde mejor en condiciones adversas sin riego después de su establecimiento. Para reducir la altura, pode las plantas a mediados del verano, antes de que empiecen a florecer, y recorte hasta las rosetas basales después de la floración. No hace falta protección contra el frío. Seaside goldenrod también está prácticamente libre de enfermedades.

Condiciones del sitio

Esta planta necesita mucho sol para florecer prolíficamente, pero tolera algo de sombra. Aunque puede darse de forma natural en zonas húmedas a mojadas, es importante plantarla en suelos arenosos y bien drenados para obtener el mejor rendimiento en los paisajes. Esto mantiene su altura bajo control, evita que las plantas se caigan o requieran tutores, y produce floraciones más llamativas. Seaside goldenrod tolera la sal.

Zonas de rusticidad

Seaside goldenrod se adapta mejor a las zonas 8A-11.

Otras especies

Wand goldenrod (*Solidago stricta*) florece en otoño con estrellas ardientes de color lavanda en las comunidades más húmedas de bosques planos y praderas en toda la Florida. Tiene el mismo aspecto de varita delgada de la estrella ardiente, pero sus flores son de color amarillo dorado. Esta planta perenne de 2 a 4 pies tiene pequeñas hojas basales y hojas aplanadas muy pequeñas en los tallos florales, que mueren cuando maduran las semillas.

Pinebarren goldenrod (*Solidago fistulosa*) es la vara de oro más común de Florida y se encuentra en lugares alterados y en bosques planos de pinos, suelos más húmedos y hábitats secos de tierras altas en toda Florida. Las panículas de sus cabezas de flores doradas se encuentran en los extremos de los tallos que alcanzan de 3 a 5 pies. Se propaga por rizomas hasta cubrir grandes superficies, por lo que debe colocarse con cuidado en el paisaje.

Chapman's goldenrod (*Solidago odora* var. *chapmanii*) le gustan los suelos secos y arenosos de las colinas de arena y los bosques abiertos de madera dura en la península y algunas áreas del Panhandle central. No se propaga por rizomas, y es una planta ramificada relativamente delgada que alcanza de 3 a 4 pies de altura - más corta que la mayoría de las otras especies. Sus flores doradas típicas florecen desde finales del verano hasta principios del otoño y se encuentran en las puntas de las ramas que se inclinan hacia abajo.



Pinebarren goldenrod

4-5'
Néctar



Monarca en Elliott's aster



Azufre de barras amarillo en Climbing aster

Con una abundancia de hermosas flores, no hay mejor género de flores silvestres que el áster (*Symphyotrichum* spp.) para atraer polinizadores a su jardín.

De las 26 especies de áster autóctonas de Florida, varias son adecuadas para su uso paisajístico. Climbing aster (*S. carolinianum*) es un arbusto en forma de enredadera. Ocurre naturalmente en bosques de madera dura costeras, bosques planos húmedos y a lo largo de los bordes de pantanos, manantiales y arroyos. Elliott's aster (*S. elliotii*) es una planta herbácea perenne, erguida y multiramificada, que se da en bosques planos húmedos, pantanos y marismas de agua dulce. Ambas especies pueden encontrarse prácticamente en toda la península y en el Panhandle oriental, aunque el Climbing aster tiene una distribución ligeramente mayor.

Como especies de floración otoñal e invernal, Climbing aster y Elliott's aster ayudan a ampliar las opciones de néctar y polen disponibles para los polinizadores. Climbing aster es una de las pocas flores silvestres que florecen en diciembre.

Mariposas y abejas

Las flores atraen a las abejas melíferas y a una miríada de abejas autóctonas, como las del poliéster, sudoríparas, cucullas, cortadoras de hojas, mineras, abejorros y minadoras. A las mariposas y polillas también les encantan: se sabe que monarcas, Pearl crescents, salteadores, fritillarias, Common buckeyes, Gray hairstreaks, colas de golondrina y azufres frecuentan las flores en busca de néctar.

Descripción

Las extremidades Climbing aster pueden extenderse hasta 8 pies o más. Las flores miden de 1 a 2 pulgadas de diámetro y tienen una fragancia muy dulce. Tienen centros densos de flósculos de disco amarillo-anaranjados. Los flósculos de rayos varían en color desde lavanda hasta morado-rosado y

violeta. Las hojas son de color verde grisáceo y de forma elíptica a ovada con márgenes enteros. Climbing aster florece en otoño y continúa hasta enero; puede florecer todo el año en condiciones favorables.

Elliott's aster puede crecer hasta 4 o 5 pies de altura. Sus flores miden alrededor de 1 pulgada de diámetro, con flósculos de rayos de color lavanda pálido que rodean un centro de flósculos de disco de color amarillo anaranjado. Las flores nacen en densos racimos en forma de corona. Las hojas son brillantes y elípticas a lanceoladas con márgenes dentadas. Elliott's aster normalmente florece a finales de otoño y se marchita en invierno.

Plantación

El carácter expansivo del Climbing aster lo hace adecuado para cultivarlo a lo largo de una espaldera o cerca. Elliott's aster es mejor para una plantación naturalista, y debe mantenerse con frecuencia en un entorno más formal. Ambas son auto-sembradoras prolíficas. Elliott's aster también se propaga por retoño.

Semillas

Las semillas de Elliott's aster están disponibles comercialmente. Siembre en otoño.

Plantas

Climbing aster suele encontrarse en los viveros de plantas autóctonas. Elliott's aster está cada vez más disponible.

Cuidado

Recorte el Climbing aster a finales de invierno, después de la floración, para fomentar futuras floraciones y un crecimiento sano. Elliott's aster puede retoñar y formar densas colonias. Los retoños se pueden quitar, pero hay que cuidarlos durante todo el período de crecimiento para evitar que superen a otras especies. Ambas especies pueden resultar problemáticas en paisajes formales, ya que pueden adoptar un aspecto enredado o

caótico; sin embargo, se pueden podar para darles cualquier forma y también funcionan bien como seto.

Condiciones del sitio

Tanto Elliott's como Climbing aster prefieren suelos arenosos, limosos u orgánicos que estén húmedos, aunque pueden tolerar suelos moderadamente secos. Plántela a pleno sol o en sombra parcial. Ninguno de los dos tolera la sal.

Zonas de rusticidad

Climbing aster y Elliott's aster son adecuados para las zonas 8A–11.

Otras especies

Otras especies de *Symphyotrichum* pueden estar disponibles en viveros autóctonos. Rice button aster (*S. dumosum*) crece de 2 a 3 pies de altura y produce pequeñas flores de color blanquecino-lavanda. Rebota en tallos individuales. Georgia aster (*S. georgianum*) tiene flósculos de rayos azul aciano a morados y anteras blancas contrastantes. Requiere un poco más de humedad y sol que *S. elliotii* o *S. carolinianum*.

Eastern silver aster (*S. concolor*) es una especie de tierras altas que tolera muy bien la sequía. Sus flores son de color violeta intenso y nacen en otoño en los extremos de tallos largos. Debe su nombre a su follaje verde plateado. Walter's aster (*S. walteri*) es una especie de tierras altas que prefiere los suelos secos y bien drenados. Sus flores son más pequeñas y tienen menos flósculos de rayos y más distintivos flósculos de disco. No debe plantarse al sur de la Florida Central.



Climbing aster flores y botones florales

Mostrar a los vecinos tu **lado** salvaje —

¡Planta flores silvestres de Florida!



Wildflower Seed and Plant Growers Association

Los paquetes de semillas cubren 60 pies cuadrados y están disponibles en una variedad de flores silvestres.

Para más información, llame al (352) 988-8117, envíe un correo electrónico a businessmanager@FloridaWildflowers.com o visite **www.FloridaWildflowers.com**.




Recursos

Native Plants for Florida Gardens

(216 páginas, \$21.95)

¡Aprenda sobre 100 flores silvestres, hierbas, arbustos, enredaderas y árboles autóctonos de Florida que pueden transformar los paisajes típicos de Florida! Este libro, de la Florida Wildflower Foundation, contiene fotos inspiradoras, consejos sobre el cuidado y el uso del paisaje, y mucho más. Obtenga una vista previa y compre su copia en **www.FlaWildflowers.org/shop**.




Visite **www.FlaWildflowers.org** para:

- Obtenga más información sobre la selección y plantación de flores silvestres.
- Descargue folletos para ayudar con la selección, el cultivo y el mantenimiento de las plantas.
- Lea artículos informativos sobre cómo atraer polinizadores a su paisaje.

Otros recursos

- www.PlantRealFlorida.org
- www.FloridaWildflowers.com
- www.FNPS.org
- www.RegionalConservation.org/beta/nfyn/default.asp

Mapa de Zonas de Rusticidad del USDA



Obtenga la placa que alimenta a mariposas y abejas

¡Pida la placa de flores silvestres del estado!



Compre su placa de matrícula de flores silvestres del estado con sólo una llamada telefónica.

Visite www.WildflowerTag.com para solicitar una llamada.



FPL.com

En Florida Power & Light Company,
respetamos nuestro medio ambiente y estamos comprometidos a ser un líder de la industria en conservación.

